



**HRVATSKA**

**POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA**

**SAVJETODAVNA SLUŽBA**

**PODRUŽNICA ZADARSKE ŽUPANIJE**

## **BOLEST ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE**

Zlatna žutica vinove loze, (*Grapevine Flavescence dorée*) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze („Narodne novine“ br. 46/2017).

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladima lucnja ili reznika.

### **Simptomi na listu:**

- Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
- Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

### **Simptomi na mladima:**

- Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

### **Simptomi na grozdovima:**

- Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje grozd postupno vene i ne dozrijeva.

## ŠIRENJE BOLESTI

- zaraženim sadnim materijalom,
- vektorom.

Američki cvrčak (*Scaphoideus titanusBall*), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

### **VAŽNO!**

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti fitosanitarnog inspektora ili Zavod za zaštitu bilja Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo ili Savjetodavnu službu.